


Formation à la reconnaissance des plantes de la MAEt
« Prairies Sèches - Collines du Morvan des 400 mètres »

Herbier des plantes indicatrices



10 juin 2008



Nom français : **Pied d'oiseau**

Ecologie: espèce des affleurements rocheux siliceux, se rencontre également sur les pelouses aux sols minces et pauvres.

Taille : espèce dépassant rarement 20 cm.

Période de floraison : mai à septembre

Notes personnelles:

Pied d'oiseau (*Ornithopus perpusillus.L*)



Nom français : **Scléranthe**

Ecologie: sols siliceux secs et dalles rocheuses

Taille : 2-20 cm.

Période de floraison : mai à octobre

Notes personnelles:

Scléranthe (*Scléranthus sp.*)



Jasione des montagnes (*Jasione montana*.L)

Nom français : **Jasione des montagnes**

Ecologie: sols secs plutôt acide

Taille : 10-35 cm.

Période de floraison : juin à septembre

Notes personnelles:



Epervière piloselle (*Hieracium pilosella*.L)

Nom français : **Epervière piloselle**

Écologie: pelouses et prairies sèches

Taille : 5-30 cm.

Période de floraison : mai à septembre

Notes personnelles:



Nom français : **Oseille**

Écologie: sols franchement acide, prairies sèches

Taille : 20-50cm cm.

Période de floraison : mai à juillet

Notes personnelles:

Oseille (*Rumex sp.*)



Potentille argentée (*Potentilla argentea*.L)

Nom français : **Potentille argentée**

Ecologie: espèce des pelouses sèches.

Taille : espèce de 15 à 50 cm.

Période de floraison : juin à septembre

Notes personnelles:



Petite Pimprenelle (*Sanguisorba minor. Scop*)

Nom français : **Petite Pimprenelle**

Ecologie: pelouses et prairies assez sèches

Taille : 15-80 cm.

Période de floraison : mai à septembre

Notes personnelles:



Thym (*Thymus sp.*)

Nom français : **Thym**

Ecologie: Pelouses très maigres généralement acides.

Taille : espèce de 5 à 25 cm.

Période de floraison : juin à août

Remarque : espèce très odorante.

Notes personnelles:



Nom français : **Fétuque (en touffe)**

Ecologie: pelouses thermophiles ouvertes sur sols très maigres, affleurements rocheux ;

Taille : espèce 20-60 cm.

Période de floraison : mai à juillet

Remarque : coloration gris bleuté.

Notes personnelles:

Fétuque (*Festuca sp.*)



Genêt ailé (*Genistella sagittalis.L*)

Nom français : **Genêt ailé**

Ecologie: pelouses sèches sur sols acides.

Taille : espèce de 15-40 cm.

Période de floraison : mai à juillet

Notes personnelles:



Nom français : **Sauge des prés**

Ecologie: prairies généralement sèches

Taille : espèce de 30-80 cm.

Période de floraison : mai à août

Notes personnelles:

Sauge des prés (*Salvia pratensis.L*)



Polygala (*Polygala Sp.*)

Nom français : **Polygala**

Ecologie: espèce des pelouses sèches

Taille : de 5 à 25 cm

Période de floraison : mai à août

Remarque : couleur des fleurs très variables, du bleu foncé au rose pâle, quasiment blanc.

Notes personnelles:



Centauree (*Centaurea sp.*)

Nom français : **Centauree**

Ecologie: prairies plus mésophiles (moins maigres)

Taille : espèce de 30 à 100 cm.

Période de floraison : juin à octobre

Notes personnelles:



Pied de Poule (*Lotus corniculatus*.L)

Nom français : **Pied de poule ou Lotier corniculé**

Ecologie: prairies sur sols mésotrophes et plutôt secs.

Taille : espèce de 5 à 30 cm.

Période de floraison : mai à septembre

Notes personnelles:



Caille-lait jaune (*Galium verum*.L)

Nom français : **Caille-lait jaune ou Gaillet Jaune**

Ecologie: prairies sèches.

Taille : 10-80 cm.

Période de floraison : mai à septembre

Notes personnelles:



Nom français : **Gesse des prés**

Ecologie: souvent dans les prairies de fauche mésotrophe

Taille : espèce de 30 à 120 cm.

Période de floraison : juin à août

Notes personnelles:

Gesse des prés (*Lathyrus pratensis.L*)



Nom français : **Marguerite**

Ecologie: Prairies mésophiles plutôt neutre. Espèce assez largement répartie

Taille : espèce de 30 à 70 cm.

Période de floraison : mai à août

Notes personnelles:

Marguerite (*Leucanthemum vulgare*.LAM)



Nom français : **Achillée millefeuille**

Ecologie: Prairies sèches, pelouses, milieux rudéraux.

Taille : espèce de 15 à 45 cm.

Période de floraison : juin à novembre

Notes personnelles:

Achillée millefeuille (*Achillea millefolium*.L)



Oreille d'âne (*Knautia arvensis*.L)

Nom français : Oreille d'âne ou Knautie des champs

Ecologie: prairies, friches, espèce thermophile.

Taille : espèce de 30 à 60 cm.

Période de floraison : juin à septembre

Notes personnelles:



Seneçon à feuille d'adonis (*Senecio adonidifolius*.LOISEL)

Nom français : **Seneçon à feuilles d'adonis**

Ecologie: sols siliceux, pelouses

Taille : espèce de 30 à 70 cm.

Période de floraison : juillet à octobre

Notes personnelles:



Germandrée scorodoine (*Teucrium scorodonia*.L)

Nom français : **Germandrée scorodoine**

Ecologie: lisières forestières, friches sur substrats secs

Taille : espèce de 25 à 75 cm.

Période de floraison : juillet à août

Notes personnelles: